

令和8年産水稻の生育状況と栽培管理について

令和8年10月5日、9日
備前広域農業普及指導センター

1 気象の経過と生育状況

(1) 気象概況




図1 気象の推移 (アメダスポイント：岡山)

表1 気温、降水量、日照時間の月別値

	5月	6月	7月	8月	9月
平均気温(°C)	20.7	22.8	29.1	29.8	24.6
平年値(°C)	19.1	22.7	27.0	28.1	23.9
平年差(°C)	1.6	0.1	2.1	1.7	0.7
降水量(mm)	62	428	87	60	258
平年値(mm)	113	169	177	97	142
平年比(%)	55	253	49	62	181
日照時間(時間)	255	118	230	242	118
平年値(時間)	206	154	170	203	157
平年比(%)	124	77	135	119	75

(2) 水稻の生育概況

- ・育苗期は昼夜の気温差が大きく高温であったことから、一部で苗立ち枯れ病の発生がみられた。
- ・移植後の生育は、6月下旬の低温傾向や日照不足により分けつが遅れていたが、回復した。
- ・出穂期は、中生品種は概ね平年並み、晩生品種は平年並～やや遅かった。
- ・一部でジャンボタニシが発生しており、食害が散見された。
- ・コブノメイガの食害と紋枯病の発生が見られる。

2 収 穫

- ・高温年では、収穫期が早まり刈遅れると、茶米や胴割米が増えて、品質低下の原因となる。
- ・収穫適期は、出穂後日数と積算温度からおおよその目安を定め、実際に穂を観察し、青味率から最終判断する。
- ・刈取り始めの籾の水分は、25～26%程度を目安とする。
- ・青味率の確認
 - ①平均的に育っている株の最も丈の高い穂を選ぶ。
 - ②穂の中で不稔籾を除き、青味籾の割合を見る。
- ・特に「にこまる」は、登熟期が低温の場合に成熟が遅れたり、青未熟粒が多発したりすることがあるため、籾の成熟度合いを見て適期を判断する。



図2 青味率17%

表2 品種ごとの収穫適期の目安

品 種	出穂後積算温度	出穂後日数	青味率
きぬむすめ	950～1,100℃	38～45 日	15～10%
つやきらり	1,050～1,200℃	42～50 日	
ヒノヒカリ	950～1,100℃	38～45 日	
にこまる	1,000～1,200℃	40～50 日	
朝日、アケボノ	900～1,100℃	40～50 日	

注1) 青味率とは不稔籾を除いた全籾のうち、青味が残っている籾の割合

注2) 水稻栽培指針、J A岡山「つやきらり栽培のしおり」より引用、一部普及センター調べ。




図3 出穂期と穂刈期の見分け方

表3 品種ごとの出穂期の目安 (田植)

品 種	きぬむすめ	つやきらり	ヒノヒカリ	にこまる	朝日	アケボノ
出穂期	8/18～22	8/23～27	8/25～28	8/28～9/1	9/2～5	9/3～8

3 乾燥・調製

- ・計画的な収穫を行い、刈取後はすみやかに乾燥作業に入る。
- ・収穫後すぐに乾燥作業に移れるよう、乾燥機の容量に合った計画的な収穫を行う。
- ・収穫後の籾を乾燥機へ入れず、コンバイン袋のまま置いておくと、ヤケ米（発酵米）となり品質低下の原因となる（水分 25%の籾は、気温 25℃の状態、5時間程度で変質し始める）。
- ・仕上げ水分は 14.5～15.0%を目標とし、ゆっくりと乾燥させる。
- ・過乾燥は、形質や食味の低下の恐れがあるので、適正な籾水分になるように乾燥する。
- ・水分が高い籾は十分に常温送風してから加温し始め、毎時乾減率を 0.8%以下に抑えてゆっくり乾燥させる。

■ストップ！農作業事故■

作業環境を確認し、危険性に配慮しましょう！



こちらから(動画)

■農作業の安全対策情報を公開中■

農林水産省公式 YouTube チャンネル「Maffchannel」で農業における事故事例と安全対策を公開しています。

■環境負荷軽減の取組みについて■

(1)被覆穀流出防止

- ・あぜが崩れていないかを確認し、必要に応じてあぜ塗りやあぜシートを設置する。
- ・入水までに田面の高低差をなくし、代かきは浅水で行う。
- ・移植前の落水は行わず、自然落水で水位調整をする。
- ・緑肥や堆肥などの活用や、栽培暦等に基づいた適正施肥に努める。

(2)温室効果ガス(メタン)の発生抑制

- ・通常の中干し期間より、1週間程度延長する。
- ・稲刈りが終わってからの秋の間に耕うんを行い、稲わらや稲株のすき込みを行う。

※ほ場条件や作業体系に応じて、無理のない範囲でできることから取り組みましょう。

■施肥コスト低減対策技術を公開中■

農業研究所が開発した施肥コスト低減対策技術を紹介しています。

- ・レンゲやナタネを緑肥としてすき込む場合の肥料計算ソフトの紹介
- ・児島湖流域の6割の水田でりん酸やカリウムが少ないL字型が適する説明
- ・鶏ふん施用から入水まで期間を考慮した施肥設計方法 等



こちらから(HP)

令和8年度 きぬむすめ ヒノヒカリ 出穂後積算気温(岡山)

950~1,100℃

↓刈取時期		→出穂期		きぬむすめ出穂期		ヒノヒカリ出穂期		
		8/18	8/20	8/22	8/24	8/26	8/28	8/30
9/20	日	908	848	788	726	665	605	543
9/21	月	932	873	812	750	689	629	567
9/22	火	955	896	836	774	712	653	591
9/23	水	978	919	859	797	735	676	614
9/24	木	1003	943	883	821	760	700	638
9/25	金	1027	967	907	845	784	724	662
9/26	土	1048	988	928	866	805	745	683
9/27	日	1069	1010	950	888	826	766	705
9/28	月	1092	1033	973	911	849	789	728
9/29	火	1114	1054	994	932	871	811	749
9/30	水	1135	1075	1015	953	892	832	770
10/1	木	1156	1096	1036	974	913	853	791
10/2	金	1176	1117	1057	995	933	874	812
10/3	土	1197	1138	1077	1015	954	894	832
10/4	日	1217	1158	1098	1036	974	915	853
10/5	月	1238	1178	1118	1056	995	935	873
10/6	火	1258	1198	1138	1076	1015	955	893
10/7	水	1278	1218	1158	1096	1035	975	913
10/8	木	1297	1238	1178	1116	1054	994	933
10/9	金	1317	1257	1197	1135	1074	1014	952
10/10	土	1336	1277	1217	1155	1093	1033	971
10/11	日	1355	1296	1236	1174	1112	1052	991
10/12	月	1374	1315	1255	1193	1131	1071	1009
10/13	火	1393	1333	1273	1211	1150	1090	1028
10/14	水	1411	1352	1292	1230	1168	1108	1046
10/15	木	1429	1370	1310	1248	1186	1126	1065
10/16	金	1447	1388	1328	1266	1204	1144	1083
10/17	土	1465	1405	1345	1283	1222	1162	1100
10/18	日	1482	1423	1363	1301	1239	1180	1118

9/28 まで本年値、以降は平年値を使用

※ は平年の収穫適期
 はR7産の収穫適期

令和8年度 にこまる 出穂後積算気温(岡山)

1,000~1,200℃

出穂期→

↓刈取時期		8/25	8/27	8/29	8/31	9/2	9/4	9/6
10/4	日	1005	944	884	823	764	714	662
10/5	月	1025	964	904	843	784	735	682
10/6	火	1046	984	924	863	804	755	702
10/7	水	1065	1004	944	883	824	775	722
10/8	木	1085	1024	964	903	843	794	741
10/9	金	1105	1043	983	922	863	814	761
10/10	土	1124	1062	1002	941	882	833	780
10/11	日	1143	1082	1022	961	901	852	799
10/12	月	1162	1100	1040	979	920	871	818
10/13	火	1181	1119	1059	998	939	890	837
10/14	水	1199	1137	1077	1016	957	908	855
10/15	木	1217	1156	1096	1035	975	926	873
10/16	金	1235	1174	1114	1053	993	944	891
10/17	土	1253	1191	1131	1070	1011	962	909
10/18	日	1270	1209	1149	1088	1029	979	927
10/19	月	1287	1226	1166	1105	1046	997	944
10/20	火	1304	1243	1183	1122	1063	1014	961
10/21	水	1321	1260	1200	1139	1080	1030	978
10/22	木	1338	1276	1216	1155	1096	1047	994
10/23	金	1354	1293	1233	1172	1112	1063	1010
10/24	土	1370	1309	1249	1188	1129	1079	1027
10/25	日	1386	1325	1265	1204	1144	1095	1042
10/26	月	1402	1340	1280	1219	1160	1111	1058
10/27	火	1417	1356	1296	1235	1176	1126	1074
10/28	水	1432	1371	1311	1250	1191	1142	1089
10/29	木	1447	1386	1326	1265	1206	1157	1104
10/30	金	1462	1401	1341	1280	1221	1171	1119
10/31	土	1477	1415	1355	1294	1235	1186	1133
11/1	日	1492	1431	1371	1310	1251	1201	1149
11/2	月	1507	1446	1386	1325	1266	1217	1164
11/3	火	1522	1461	1401	1340	1281	1232	1179
11/4	水	1537	1476	1416	1355	1296	1246	1194
11/5	木	1552	1490	1430	1369	1310	1261	1208
11/6	金	1565	1504	1444	1383	1324	1275	1222

9月28日 まで本年値、以降は平年値を使用

※ 1122 は平年の収穫適期

1122 はR7産の収穫適期

令和8年度 朝日・アケボノ 出穂後積算気温

900~1,100℃

出穂期→

↓刈取時期		8/27	8/29	8/31	9/2	9/4	9/6	9/8
10/1	木	882	822	761	702	653	600	548
10/2	金	903	843	782	723	673	621	569
10/3	土	923	863	802	743	694	641	589
10/4	日	944	884	823	764	714	662	610
10/5	月	964	904	843	784	735	682	630
10/6	火	984	924	863	804	755	702	650
10/7	水	1004	944	883	824	775	722	670
10/8	木	1024	964	903	843	794	741	690
10/9	金	1043	983	922	863	814	761	709
10/10	土	1062	1002	941	882	833	780	728
10/11	日	1082	1022	961	901	852	799	747
10/12	月	1100	1040	979	920	871	818	766
10/13	火	1119	1059	998	939	890	837	785
10/14	水	1137	1077	1016	957	908	855	803
10/15	木	1156	1096	1035	975	926	873	822
10/16	金	1174	1114	1053	993	944	891	839
10/17	土	1191	1131	1070	1011	962	909	857
10/18	日	1209	1149	1088	1029	979	927	875
10/19	月	1226	1166	1105	1046	997	944	892
10/20	火	1243	1183	1122	1063	1014	961	909
10/21	水	1260	1200	1139	1080	1030	978	926
10/22	木	1276	1216	1155	1096	1047	994	942
10/23	金	1293	1233	1172	1112	1063	1010	959
10/24	土	1309	1249	1188	1129	1079	1027	975
10/25	日	1325	1265	1204	1144	1095	1042	991
10/26	月	1340	1280	1219	1160	1111	1058	1006
10/27	火	1356	1296	1235	1176	1126	1074	1022
10/28	水	1371	1311	1250	1191	1142	1089	1037
10/29	木	1386	1326	1265	1206	1157	1104	1052
10/30	金	1401	1341	1280	1221	1171	1119	1067
10/31	土	1415	1355	1294	1235	1186	1133	1081
11/1	日	1431	1371	1310	1251	1201	1149	1097
11/2	月	1446	1386	1325	1266	1217	1164	1112
11/3	火	1461	1401	1340	1281	1232	1179	1127

9月28日 まで本年値、以降は平年値を使用

※ は平年の収穫適期

 はR7産の収穫適期